



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Castelló d'Empúries

Avís del dia: 02 de març de 2026

Avís número: 03/2026

AVÍS REALITZAT EN COL·LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE VINYA, OLIVERA I HORTA DE GIRONA

VINYA

Flavescència daurada

Tingueu present que per evitar-ne la introducció i propagació al nostre territori, cal que en les noves plantacions utilitzeu únicament planter emparat amb el preceptiu Passaport Fitosanitari CE.

Corc del raïm

Si es vol utilitzar la tècnica de la **confusió sexual** durant aquesta campanya cal tenir en compte que els difusors o puffers s'han de col·locar abans de l'inici del vol d'adults de la primera generació. **Recomanem fer-ho durant la darrera quinzena del mes de març.**

Qui utilitzi aquesta tècnica ha de tenir en compte les següents recomanacions:

- Cal fer superfícies àmplies i tancades (sense vinyes fora de confusió a l'interior).
- Es tracta d'una tècnica de lluita col·lectiva, cal que els viticultors implicats actuïn alhora.
- S'aconsella col·locar els difusors en fileres alternes, respectant el nombre de difusors per hectàrea que recomana la casa.
- El nombre de ceps a deixar, entre difusor i difusor, dependrà del marc de plantació de la vinya i caldrà calcular-ho prèviament.
- Cal reforçar els límits de la zona de confusió, doblant el nombre de difusors o situant difusors 10 metres fora de la zona de confusió.
- Es recomana supervisió tècnica per verificar el seu funcionament.
- Cal manipular els difusors amb guants ja que, tot i que no presenten toxicitat, poden ser irritants en contacte amb les mucoses.
- En el cas del sistema puffer, cal disposar d'un mapeig previ de la finca, per tal d'establir els punts més idonis de col·locació dels cabinets.

OLIVERA

Corc de l'olivera (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Després de realitzar la poda i per tal d'evitar futurs atacs, es recomana triturar-la de manera fina, sense deixar trossos més grans de 10 cm o bé cremar-la. En cas que es vulgui conservar com a llenya, caldrà fer-ho en llocs tancats hermèticament o allunyats d'oliveres.

Més informació: [El corc de l'olivera](#)



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Castelló d'Empúries

Repilo, ull de gall o emplomat

Cal estar atents a la previsió meteorològica dels pròxims dies. Degut al augment de temperatures i les mullenes matinals, es recomana realitzar un tractament després de pluges.

Per tal de disminuir l'inòcul de la malaltia cal tenir en compte les següents mesures preventives:

- Podes que afavoreixin l'aeració interior.
- Equilibri nutricional. Evitar excés de nitrogen i deficiència en K i Ca.
- Altres aspectes com la quantitat d'inòcul de l'any anterior, varietat, marc de plantació i ubicació dels arbres.

En el cas de l'emplomat cal retirar les fulles caigudes sota l'arbre, ja que poden suposar un fort inòcul de la malaltia.

HORTA

Per a més informació sobre les plagues i malalties, podeu consultar els [avisos fitosanitaris mensuals publicats a la web de Sanitat Vegetal](#).

Consells previs a la sembra de patata

- Cal utilitzar sempre patata de sembra certificada amb el corresponent [Passaport fitosanitari CE](#).
- Evitar sembrar en parcel·les amb antecedents de nematodes o altres patologies del sòl, i respectar les rotacions llargues (mínim 3–4 anys).
- Desinfectar la maquinària i caixes per evitar disseminar patògens del sòl.
- Evitar sembrar en sòls massa humits i compactats, que afavoreixen malalties com *Rhizoctonia* o *Pythium*.
- Eliminar restes de cultiu i voluntàries, que actuen com a reservori de plagues i malalties.

El rovell dels alls i porro (*Puccinia allii*)

És una malaltia fúngica que provoca pústules taronja-oxid a les fulles, reduint l'activitat fotosintètica. Les infeccions s'afavoreixen amb humitat alta i temperatures moderades. Els símptomes avancen ràpidament en plantacions denses o amb mala ventilació. La malaltia pot generar pèrdues de rendiment i debilitament del bulb. Es recomana vigilància, eliminació de restes infectades i tractaments fungicides autoritzats quan calgui.

Fongs en general (*stemphyllium*, *septoria*, míldiu, oïdiopsis i oïdi)

Les condicions d'humitat elevada, rosada persistent i temperatures suaus estan afavorint el desenvolupament de malalties fúngiques en cultius hortícoles.

Es recomana vigilància freqüent, especialment en parcel·les denses o mal ventilades.

Cal retirar restes infectades, evitar regs per aspersió en hores de baixa evaporació i millorar l'aireig del cultiu.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Castelló d'Empúries

PARCS I JARDINS

Morrut de les palmeres i Eruga barrinadora

Si apareixen símptomes d'atac cal realitzar un tractament de xoc per evitar la seva dispersió i destruir, ràpidament, els trossos afectats per trituració en un abocador-gestor autoritzat per tractar restes de jardineria i forestals.

Processionària del pi

Les erugues es troben en el període de "processons d'enterrament", baixen dels pins per crisalidar en el terra, en aquest moment els tractaments químics perden eficàcia.

Recomanem capturar-les amb trampes específiques i posteriorment eliminar-les.

També es poden destruir les colònies, tallant-les i cremant-les immediatament.



Servei de Sanitat Vegetal a Girona (972 45 43 10)

Unitat de Sanitat Vegetal a Girona
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
17486 Castelló d'Empúries
ssv.g.daam@gencat.cat
Sanitat Vegetal Girona