



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació



## ESTACIÓ D'AVISOS DEL SERVEI DE SANITAT VEGETAL INFORMADOR AUTOMÀTIC DE MÓRA D'EBRE

Avís del dia: 27 de febrer de 2026

Avís 01/2026

**Cultius:**

**Perera, Vinya, Olivera, Ametller, Presseguer i Nectarina, i Parcs, Jardins i Espais Verds**

### ACTUACIONS EN PARCEL·LES ABANDONADES

La Llei 43/2002 de sanitat vegetal estableix l'obligació d'arrencar les plantacions abandonades quan constitueixin un risc per les plantacions veïnes.

El Decret 137/2014, de 7 d'octubre, en el seu article 6.1 indica que *"Les plantacions de conreus llenyosos tenen consideració de conreu abandonat si en els darrers dos anys no s'hi ha practicat operacions de conreu"*. L'article 6.2 estableix que *"és obligatòria l'arrencada i destrucció dels conreus, plantacions, collites i material vegetal que constitueixi un risc fitosanitari greu"*.

Demanem la col·laboració per a la identificació de les parcel·les que es puguin considerar abandonades i que contacteu amb els Serveis Territorials del DARPA a les Terres de l'Ebre.

### Perera

#### Psil·la

Del seguiment de les femelles hivernants en les plantacions, s'observa que la majoria ja es troben madures. En aquests moments, tot just s'ha iniciat la posta, i es recomana realitzar el tractament per baixar els nivells de població. La millor eficàcia s'obté tractant amb temps assolellat i durant les hores més caloroses del dia, que és quan hi ha més concentració d'adults als arbres.

### Vinya

#### Malalties de fusta

Les ferides produïdes durant la poda és per on accedeixen els fongs que causen les malalties de fusta. Actualment, no existeixen mitjans de lluita curatius, motiu pel qual són d'especial importància les mesures preventives següents:

- Podar aviat les vinyes més afectades i desinfectar les tisores utilitzades.
- Eliminar i destruir els braços i els ceps morts.
- Fer una poda racional, minimitzant en la mesura del possible la realització de ferides grosses.
- Evitar períodes plujosos o humits per realitzar la poda.
- Aplicar algun protector o màstic sobre les ferides de poda.

## Olivera

### Repilo

Cal fer el tractament si es veuen taques a les fulles i repetir-lo cada 4-5 setmanes si es continuen veient símptomes. En cas de pluges o humitats altes que afavoreixen les infeccions cal que realitzeu un tractament preventiu. Si plou més de 15 - 20 litres/m<sup>2</sup> s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

### Fongs i Tuberculosi o berrugues (*Pseudomonas savastanoi*)

Els bacteris es troben en la superfície dels brots i fulles. Per penetrar en el vegetal i contaminar el teixit necessiten que hi hagi una ferida a l'escorça. Les causes més freqüents són: la recol·lecció, les pedregades, les gelades, la poda i la caiguda de les fulles a causa de malalties.

Per aquest motiu, i per mantenir un bon estat sanitari dels arbres, al finalitzar la collita és recomanable realitzar un tractament a base de coure i compostos cúprics per protegir les ferides.

## Ametller

### Varietats de prefloració: Arrufat i Cribat

En aquelles finques en què la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat, cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a la caiguda dels pètals. Si hi ha humitat, cal mantenir protegit el cultiu.

### Varietats a inici de floració: Monilia

A les finques que presenten problemes per aquesta malaltia, cal realitzar un tractament a inici de floració. En presència d'humitats cal repetir-lo a plena floració.

## Presseguer i Nectarina

### Arrufat i Cribat

A l'inici de vegetació és el període crític, sobretot en cas de produir-se fortes mullenes. Cal protegir els arbres just abans de l'obertura dels borrons. En cas de detectar afectació, o bé en plantacions que presenten incidència normalment, es recomana renovar la protecció durant els períodes plujosos o d'humitats relatives elevades.

## **Anarsia**

A les finques que van tenir problemes l'any anterior, es recomana el control de les larves hivernants abans de l'estadi fenològic E.

## **Poll de Sant José, Poll Blanc i Pugó**

Es recomana tractament de botó rosa – primera flor oberta en aquelles varietats de floració primerenca.

## **Xancres (*Fusicoccum sp*, *Monilia sp*)**

Fins a caiguda de pètals es poden produir atacs d'aquests dos fongs. En aquesta època la *Monilia* produeix l'assecament de flors que resten fortament adherides als brots. Les finques amb problemes cal protegir-les a inici de floració. En presència d'humitats cal repetir-lo a plena floració. També afecta a l'albercoquer i altres fruiters.

## **Parcs, Jardins i Espais Verds**

### **Morrut de les Palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

La vigilància de les palmeres sensibles és l'eina principal de lluita contra el morrut. És el moment idoni per fer treballs de poda ja que s'han d'efectuar durant els mesos de desembre, gener i febrer. En palmeres afectades amb possibilitats de recuperació, cal netejar les parts afectades per afavorir l'efecte dels tractaments fitosanitaris. Les que no tenen possibilitats de recuperació cal eliminar-les immediatament. Les restes de parts afectades es duren a les plantes de recollida i gestió establertes.

### **Processionària del Pi (*Thaumetopoea pityocampa*)**

Els atacs es poden identificar per la presència de plomalls secs als pins atacats i per les bosses ja visibles en indrets on han baixat les temperatures.

Es pot procedir a tallar i destruir els brots amb erugues o les bosses mitjançant la crema, immersió en aigua, etc... En els casos en que no sigui possible cal recórrer a tractaments químics, tenint en compte que aquesta època és la idònia per realitzar aquesta actuació.

### **Informació facilitada per l'informador automàtic de Móra d'Ebre (977 40 14 66)**

Plaça Democràcia, s/n. 43740 Móra d'Ebre. Telèfon 977 40 00 24 [ssv.te.daam@gencat.cat](mailto:ssv.te.daam@gencat.cat) <http://www.gencat.cat/daam>

Podeu trobar més informació al web del Departament:

[www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

[twitter.com/agriculturacat](https://twitter.com/agriculturacat)

[facebook.com/agriculturacat](https://facebook.com/agriculturacat)